

LISTE

DES

Espèces de Champignons récoltées en Picardie

Pendant les années 1890-91 et 92.

Par M. L. ARNOULD.

Cette nomenclature encore bien pauvre n'a d'autre but que d'apporter sa contribution à la géographie mycologique du Nord de la France. Cette région est peu connue, car les mycologues parisiens ne dépassent guère au Nord la forêt de Compiègne.

Sous la dénomination « marais », je comprends les bois à sol tourbeux de la vallée de la Somme. La grande humidité et la quantité considérable d'humus de ces terrains favorisent certaines espèces et donnent une physionomie spéciale à leur flore.

Cette première liste comprend 386 espèces dont 328 Hyménomycètes, 12 Gastéromycètes et 46 Ascomycètes.

Dans mes premières déterminations, j'ai eu pour guide M. Bourquelot; j'ai pu ensuite les continuer avec son aide et avec le concours de M. Boudier qui prodigue sans compter son temps et sa science à ses collègues inexpérimentés.

HYMÉNOMYCÈTES

Agaricinés

(¹) **Amanita** Fr. — *A. virosa* Fr. — Les bois. Mennessis, Hôpital.

A. phalloides Fr. — Villers-Bretonneux, Mennessis, Sancourt, Saint-Gobain.

(1) Le nom de genre est suivi du nom de l'auteur du genre. L'auteur de l'espèce suit le nom de l'espèce; il est entre parenthèses quand il n'est pas l'auteur du genre.

- A. mappa* Fr. — Tous les bois.
- A. vaginata* (Bull.). — Var. *fulva*. Les grands bois. — Var. *livida*.
Les grands bois et les bosquets, près marécageux.
- A. muscaria* (L.). — Les bois. Marais d'Estouilly sous les bouleaux.
- A. pantherina* (D. C.). — Mennessis, Hôpital.
- A. rubescens* (P.). — Tous les bois, très-commune dans les sables.
- Lepiota** Fr. — *L. procera* (Seop.). — Beaumont. Rare.
- L. acutesquamosa* (Weinm.). — Marais d'Estouilly et de Brouchy en octobre.
- L. clypeolaria* (Bull.). — Les bois, Sancourt, Mennessis.
- L. cristata* (A. S.). — Bois, talus des routes, marais.
- L. naucina* Fr. — Talus herbeux, près. Rare.
- L. alba* (Bresadola). — Bois, marais. Août, septembre.
- L. granulosa* (Batsch). — Bois. Hôpital, Beaumont, Sancourt.
- L. seminuda* (Laseh). — Marais d'Estouilly. Septembre.
- L. mastoïdea* Fr. — Beaumont.
- Armillaria** Fr. — *A. mellea* (Fl. Dan.). — Bords de la Somme, très-rare dans les marais, très fréquent à l'hôpital.
- Tricholoma** Fr. — *T. flavo-brunneum* Fr. — Marais, bois.
- T. pessundatum* Fr. — Les prés et talus plantés de peupliers, très abondant à Brouchy.
- T. terreum* (Schæff.). — Partout. Très-variable ; dans les marais il est presque complètement blanc.
- T. saponaceum* Fr. — Bois. Sancourt, Hôpital, Genlis
- T. fimosum* (P.). — Hôpital. Suit les racines des marronniers sur les chaussées.
- T. sulfureum* (Bull.). — Bois. Toujours commun dans les marais d'Estouilly.
- T. ionides* (Bull.). — Marais. Septembre.
- T. Georgii* (L.). — Bosquets plantés de frênes. Avril, mai. Excellent comestible.
- T. album* (Schæff.). — Marais. Très-commun. Saveur très piquante.
- T. nudum* (Bull.). — Grands bois en octobre. Marais en septembre.
- T. grammopodium* (Bull.). — *T. melaleucum* (P.). — Marais.
- T. arcuatum* (Bull.). — Ressemble au précédent, mais a des lames décurrentes par une dent, chapeau à la fin retourné, lamelles très-blanches. — *Tr. sordidum* Fr. — Bois.

Clitocybe Fr. — *C. nebularis* (Batsch). — Bois, bosquets.
Octobre et décembre.

C. socialis Fr. — Mennessis, Hôpital. Fin août, septembre.

C. odora (Bull.). — Bois. Une seule fois dans les marais d'Estouilly.
— *C. decastes* Fr. — Saint-Gobain, basse forêt.

C. aggregata (Schæff.). — Sancourt. — *C. infundibuliformis* (Schæff.). — Bois. Septembre.

C. geotropa (Bull.). — Marais. — *C. inversa* (Scop.). — Bois. Saint-Gobain. — *C. expallens* (P.). — Bois. — *C. fragrans* (Sow.). — Marais. Sous les aulnes. — *C. obsoleta* (Batsch). — Marais. — *C. proxima* (Boud.). — Bois.

C. laccata (Scop.). — Dans tous les bois. La var. *amethystina* est rare dans les marais où je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois à une certaine hauteur sur une souche. La var. *carnea* y est commune, souvent difforme, à pied monstrueux et de dimensions très-variables.

Collybia Fr. — *C. radicata* (Relh.). — Bois. Rare en marais.

C. longipes (Bull.). — Bosquets, bois. — *C. platyphylla* (P.). — Hôpital. Octobre. — *C. fusipes* (Bull.). — Grands-Bois. Villers-B^x, Hôpital. Frières.

C. maculata (A. et S.). — Hôpital, dans les fougères. — *C. butyracea* (Bull.) — Mennessis, Beaumont. Octobre.

C. stridula Fr. — *C. velutipes* (Curt.). — Marais. Sur les saules. Toute l'année.

C. dryophila (Bull.). — Bois, marais, toits de chaume.

C. atrata Fr. — Bois.

Mycena Fr. — *M. pura* (P.). — Bois, marais. — *M. galericulata*

(Scop.). — Marais. — *M. polygramma* (Bull.). — *M. alcalina* Fr.

— Sancourt. Octobre. — *M. sanguinolenta* (A. et S.) —

M. galopus (P.). — *M. epipterygia* (Scop.). — *M. corticola*

(Schum.). — Marais.

Omphalia Fr. — *O. umbilicata* (Schæff.). — N'est pas rare dans le marais d'Estouilly sur la terre.

O. fibula (Bull.). — Sur les mousses des marais.

Pleurotus Fr. — *P. corticatus* Fr. — Marais. Frênes.

P. ulmarius (Bull.). — Ormes des routes.

- P. subpalmatus* Fr. — Gélatineux, rosé. Sur un poteau.
- P. sapidus* (Kalchbr.). — Spores lilas. Sur orme mort. Très bon comestible.
- P. ostreatus* (Jacq.). — Sur frêne à Estouilly. Sur saules, le chapeau est bai pâle. Marais.
- Volvaria** Fr. — *V. parvula* (Weinm.). — Talus des routes. Septembre, octobre.
- Pluteus** Fr. — *P. cervinus*. — (Schæff.). — Marais. Toute l'année. De nuances diverses. — *P. salicinus* (P.). — Septembre. Marais. — *P. hispidulus* Fr. — Août, septembre. Marais. — *P. nanus* (P.). — *P. semibulbosus* (Lasch.). — Sur souches. Marais. Assez rare.
- P. chrysothæus* (Schæff.). — Ordinairement assez rare, paraît sur les souches de saules en mai, juin. A été très-commun en septembre 1892 sur souches pourries de diverses essences d'arbres. Marais d'Estouilly.
- P. Roberti* Fr. — Le plus élégant des champignons des marais. Les échantillons que je récolte sont toujours de grande taille, le chapeau est côtelé et velouté de noir, les lamelles sont bordées de noir sur l'arête, le pied plus pâle est couvert de fines squames surtout vers la base. Souches pourries du peuplier. Le genre *Pluteus* est le plus richement représenté dans les marais tourbeux, où il rencontre son substratum favori, le bois pourri, dans un état d'humidité constant.
- Entoloma** Fr. — *E. sinuatum* Fr. — Bois frais. — *E. lividum* (Bull.). — Frières. — *E. rhodopodium* Fr. — Bois, marais. — *E. sericeum* (Bull.). — Talus herbeux. — *E. nidorosum* Fr. — Marais.
- Clitopilus** Fr. — *C. orcella* (Bull.). — Tous les bois. Juillet, août, septembre, octobre.
- Leptonia** Fr. *L. euchroa* (P.). Jolie petite espèce qui paraît en septembre sur l'aulne, quelquefois sur le coudrier. Marais d'Estouilly.
- Eccilia** Fr. — *E. rhodocylix* (Lasch.). — J'ai récolté cette espèce lignicole sur de la terre tourbeuse dans le marais d'Estouilly.

E. undata Fr. *Clitopilus undatus* Fr. — Rangée par M. Boudier dans les *Eccilia* à cause de ses spores anguleuses. Sur de la tourbe. Septembre. Marais.

Claudopus (Worth.). — *C. variabilis*. (P.). — Marais. Sur les branches tombées.

Pholiota Fr. — *Ph. caperata* (P.). — Beaumont, Hôpital. Sept., oct., nov.

Ph. præcox (P.). — Dans l'herbe le long des routes, dans un champ de betteraves. Juin, juillet.

Ph. sphaleromorpha (Bull.). — Marais.

Ph. radicata (Bull.). — Odeur d'eau de laurier cerise détruite par l'ébullition dans l'eau. Grands bois de Villers B^x. Beaumont, Hôpital.

Ph. ægerita Fr. — Je récolte cette espèce méridionale tous les ans en octobre sur une vieille souche.

Ph. destruens (Brond.). — Chantiers de bois. Peupliers malades.

Ph. squarrosa (Müll.). — Aux pieds des pommiers souvent, des frênes et des peupliers rarement.

Ph. mutabilis (Schæff.). — Commun partout. Marais.

Inocybe Fr. — *I. pyriodora* (P.). — Mennessis, Hôpital, Sancourt.

I. Bongardii (Weinm.). — Bois l'Abbé, Villers-B^x.

I. rimosa (Bull.). — Flavy, hôpital, Villers-B^x, bois de Lannois.

I. eutheles (B et Br.). — Assez rare. Marais d'Estouilly.

I. stricta Fr. — Marais.

I. geophylla (Sow.). — Août. Marais.

I. grammata (Quel.). — Bois de Sancourt. Juillet.

Hebeloma Fr. — *H. testaceum* (Batsch). — Marais. — *H. birrnm* Fr. — Frières. — *H. strophosum* Fr. — Marais. — *H. sinapizans* (Paul.). — Bois. — *H. crustuliniforme* (Bull.). — Prés, bois. — *H. truncatum* (Schæff.). — Marais. — *H. sacchariolens* (Quélet). — Odeur agréable de foin très-pénétrante. Marais d'Estouilly.

Flammula Fr. — *F. gummosa* (Lasch). — *F. alnicola* Fr. — Frières. — *F. conissans* Fr. — Frières.

Naucoria Fr. — *N. pediades* Fr.

N. caehroides Fr. — Sur une Russule en décomposition.

Pluteolus reticulatus (P.). — Cette petite espèce est assez commune en septembre sur souches pourries, le chapeau est gris violeté, visqueux et réticulé au sommet, les lames sont jaunâtres.

Tubaria Worth. — *T. furfuracea* (P.). — Marais.

Crepidotus Fr. — *C. mollis* (Schæff.). — Dans les marais, couvre les saules et les peupliers morts.

Psalliota Fr. — *P. cretacea* Fr. — Un seul échantillon.

Ps. pratensis (Schæff.). — Pâturages.

Ps. campestris (L.). — Bois, routes, champs cultivés, herbes, silos.

Ps. sylvicola (Vitt.). — Bois. Menaësis, Beaumont, Sancourt. La variété *Xanthoderma* qui se tache de jaune par le froissement est d'une abondance extraordinaire dans les bosquets de la plaine à sol argileux. Ce champignon est d'une digestion facile, mais il est trop parfumé. De juin à octobre inclus.

Ps. setigera Fr. — Bosquets.

Stropharia F. — *S. æruginosa* (Curtis). — Marais, bois.

S. obturata Fr. — Talus.

S. semiglobata (Batsch). Menaësis.

Hypholoma Fr. — *H. sublateritium* (Schæff.). — Bois.

H. fasciculare (Huds.). — Partout. Marais.

H. lacrymans Fr. — Chemins herbeux des bois, chaumes, silos.

H. appendiculatum (Bull.). — Marais, bois.

Psilocybe Fr. — *P. cernua* (Fl. D.). — Villers-Bx. Septembre.

P. feniseeii (P.). — Herbes.

P. spadicæa Fr. — Sancourt. Octobre.

Psathyra Fr. — *P. corrugis* (P.)

Panæolus Fr. — *P. separatus* (L.). — Villers-Bx. Septembre.

Psathyrella Fr. — *P. gracilis* Fr. — Blanc et rosé, lamelles bordées de rose. Marais d'Estouilly.

P. disseminata (P.). — Marais.

Coprinus P. — *C. atramentarius* (Bull.).

C. comatus (Fl. D.).

Bolbitius Fr. — *B. hydrophilus* (Bull.). — Hôpital, Mennessis, Beaumont.

Cortinarius Fr. — *C. triumphans* Fr. — Sancourt, Mennessis.

C. turmalis Fr. — Sancourt. — *C. crassus* Fr. — *C. cyanopus* (Secr.). — *C. variicolor* (P.). — *C. multiformis* Fr. — *C. glaucopus* (Schæff.). — *C. rufolivaceus* (P.). — *C. colimitus* (Sow.). — Un seul échantillon dans les marais. — *E. elatior* Fr. — *C. argutus* Fr. — *C. alboviolaceus* (P.). — *C. bolaris* (P.). *C. sublanatus* (Sow.). — *C. cinnabarinus* Fr. — *C. cinnamomeus* (L.). — *C. bivelus* Fr. — *C. armillatus* Fr. — *C. hemitrichus* (P.). — Marais, assez commun. — *C. subferrugineus* (Batsch.). — *C. privignus* Fr. — *C. duracinus* Fr. — *C. saturninus* Fr. — Marais, assez commun. — *C. semisanguineus*. — *C. tophaceus* Fr.

Dans cette liste de 25 cortinaires qui habitent les bois voisins, on trouve seulement deux espèces, les *C. hemitrichus* et *C. saturninus* qui ont pris pied dans les marais de la vallée de la Somme.

Gomphidius Fr. — *G. glutinosus* (Schæff.). — Dans une haie de conifères.

Paxillus Fr. — *P. involutus* (Batsch.). — Partout, dans les marais avec un pied démesuré, comme la majorité des espèces qui ont cet habitat.

Hygrophorus Fr. — *H. chrysodon* (Batsch.). — Villers-B. — *H. eburneus* (Bull.). — *H. Cossus* (Sow.) — *H. agathosmus* Fr. — Beaumont, sous quelques pins. — *H. nemoreus* (Lasch.). — Hôpital. — *H. pratensis* (P.). — Marais talus. — *H. virgineus* Fr. — *H. conicus* (Scop.). — Marais. — *H. psittacinus* (Schæff.). — Marais.

Lactarius Fr. — *L. torminosus* (Schæff.). — Marais. Très-abondant dans les sables

L. turpis (Weimm.). — *L. controversus* (P.). — Prés. — *L. blennius* Fr. — Marais. — *L. uvidus* Fr. — Marais. —

L. pyrogalus (Bull.). — *L. piperatus* (Scop.). — *L. velle-reus* Fr. — A lait âcre, assez rare. — *L. velutinus* (Bert.). — Lait doux, chair âcre. Très-commun.

L. pallidus (P.).

L. quietus Fr. — Marais, où il atteint des dimensions extraordinaires.

L. aurantiacus (Fl. D.). — Sancourt.

L. cremor Fr. — Rare. Marais de Saint-Sulpice, n'a été abondant qu'en septembre 1890.

L. theiogalus (Bull.). — *L. vietus* Fr. — *L. rufus* (Scop.). — *L. helvus* Fr. — Mennessis.

L. glyciosmus Fr. — Sancourt, Beaumont, marais d'Estouilly.

L. fuliginosus Fr. — *L. lilacinus* (Lasch). Marais planté d'aulnes.

L. volemus Fr. — *L. serifluus* (D. C.).

L. subdulcis (Bull.) — Bois et marais où il n'est pas rare.

Russula Pers. — *R. nigricans* (Bull.).

R. adusta (P.). — *R. delica* Fr. — *R. furcata* P. — *R. vi-rescens* (Schæff.). *R. lepida*.

R. cyanoxantha (Schæff.). — *R. heterophylla* (Fr.). — *R. fæ-tens* P. — *R. pectinata* (Bull.).

R. ochroleuca P. var. *gingibilis* (Britzelm).

R. æruginea (Fr.). *R. graminicolor* (Secrétan et Quélet). — Diffère du *R. furcata* par ses lames qui ne sont fourchues qu'à la base et pas au milieu.

R. fragilis P. — Une variété violette se rencontre dans les marais.

R. badia (Qu.). — Marais d'Estouilly. Septembre.

R. integra (L.). — *R. alutacea* (Fr.). — *R. lutea* (Huds.). — *R. vitellina* P.

R. citrina (Gillet). — Estouilly. Octobre. Rare.

Cantharellus Adans. — *C. cibarius* (Fr.). — Tous les bois.

C. carbonarius (A. et S.). — Frières.

C. tubæformis (Fr.). — Hôpital, Beaumont.

C. cinereus P.

Nyctalis Fr. — *N. parasitica* (Bull.). — *N. asterophora* Fr.

Marasmius Fr. — *M. peronatus* (Bolt.).

- M. oreades* (Bolt.).
M. scorteus Fr. — Espèce assez commune dans le marais d'Estouilly. Septembre.
M. erythropus Fr. — Sancourt, hôpital.
M. rotula (Scop.). — Bois, marais.
M. cohærens (P.). *Mycena cohærens* Fr. — Mennessis.
- Lentinus** Fr. — *L. tigrinus* (Bull.). — Marais, souches de saules. Avril, mai et septembre. Sur une traverse du chemin de fer.
L. degener (Kalchbr.). — Se montre sur les souches de peupliers, en mai, sous la forme d'une petite corne roussâtre qui atteint 5 à 6 centimètres de haut lorsque le chapeau commence à paraître. On le trouve aussi en septembre, mais moins vigoureux qu'au printemps. Estouilly.
L. cochleatus (P.). — Hôpital, Mennessis
- Panus** Fr. — *P. torulosus* (P.). — Trouvé une seule fois le 1^{er} juin 1891 au bois de Sancourt.
P. stypticus (Bull.). — Bois, marais, sur l'aulne.
P. croceo-lamellatus (Let.). — Sur un poteau du télégraphe.
- Schizophyllum** Fr. — *S. commune* Fr.
- Lenzites** Fr. — *L. flaccida* (Bull.).
L. sæpiaria (Schæff.).

Polyporés.

- Boletus** Dill. — *B. flavus* (With.). — Pins de Mennessis
B. granulatus (L.). — Haie de conifères. — *B. badius* (Fr.). —
B. chrysenteron (Bull.).
B. subtomentosus (L.) et var. *radicans* avec des côtes sur le haut du pied, sert de transition au suivant.
B. lanatus (Rostk.). — Réseau grossier sur le haut du pied. Sancourt.
B. piperatus (Bull.). — Sancourt, Mennessis.
B. spadiceus (Schæff.). — Chapeau brun tomenteux, pied finement scarioux, tubes d'un jaune pâle, chair ne bleuissant pas, d'un goût agréable. Commun en août, à Beaumont, dans la mousse d'une cavée.

- B. pruinosus* (Fr.). — Mennessis, Saint-Gobain, Rond d'Orléans.
B. parasiticus (Bull.). — Rond d'Orléans.
B. appendiculatus (Schæff.). — Villers B^x, Fourdrain. Sept. 92.
B. pachypus (Fr.). — Villers B^x. -- *B. edulis* (Bull.). — Commun dans les bois.
B. fulvus (Fr.). — Réseau du pied à mailles très larges. Rond d'Orléans.
B. æstivalis (Fr.). — Coloration générale du *B. appendiculatus*, pas de réseau. Villers B^x, Sept. 92.
B. satanas (Lenz). — Villers B^x, Sept. 92.
B. luridus (Schæff.). — Bois et bosquets. Commun, ainsi que la var. *erythropus*.
B. versipellis (Fr. pro parte). — Espèces grises toujours tomenteuses étant jeunes.
B. scaber (Fr.).
B. rugosus (Fr.). — Chapeau brun noirâtre tomenteux. Marais d'Estouilly. Dans l'humus à une certaine hauteur d'un tronc moussu.
B. aurantiacus (Bull.). *B. versipellis* var. *aurantiacus* Fr., Gillet.
B. tessellatus (Gillet). — Très commun. Hôpital, Frières, Genlis.
B. felleus (Bull.). — Assez rare. Genlis, Mennessis, Sancourt.
B. castaneus (Bull.). — Fourdrain.
B. candicans (Fr.). — Fourdrain.

Jusqu'à ce jour je n'ai trouvé aucun Bolet sur la terre des marais.

Fistulina (Bull.). — *F. hepatica* (Huds.). — Hôpital, Beaumont.
 Rare.

Polyporus Fr. — *P. biennis* (Bull.).

P. perennis (L.).

P. squamosus (Huds.). — Très commun dans les marais sur frêne, orme, noyer, une fois sur peuplier.

P. picipes Fr. — Marais, sur saule. Villers B^x.

P. nummularius Fr. — Sur branches sèches, marais.

P. lucidus (Leys.). — Rare. Sancourt, Villers B^x.

P. umbellatus Fr. — Beaumont. — *P. sulfureus* (Bull.).

P. lacteus Fr. — Sur bois de peuplier pourri. Marais.

P. fumosus (P.). — Partout dans les marais.

P. adustus (Willd.).

P. hispidus (Bull.). — Sur les pommiers en juillet.

P. betulinus (Bull.). — Etagé en grand nombre sur les bouleaux morts ou malades. Se montre en août. Marais.

P. incanus (Quélet), *fraxini* (Bull.). — Sur un peuplier blanc, marais d'Estouilly.

P. radiatus (Sow.). — Jolie espèce avec les pores satinés à reflets changeants. Ormes morts. Estouilly.

P. versicolor (L.).

Fomes Fr. — *F. applanatus* (P.). — Bords de la Somme et des ruisseaux.

F. conchatus (P.). — Marais. — *F. salicinus* Fr.

Trametes Fr. — *T. hispida* (Bagl.). — Chair brune, pores rougissants. Marais.

T. Trogii (Berk.). — Chair blanchâtre.

T. gibbosa (P.). — *T. suaveolens* (L.).

Dædalea P. — *D. quercina* (L.). — Vannes et écluses.

Merulius Fr. — *M. lacrymans* (Wulf.). — Dans une cave.

Hydnacés.

Hydnum L. — *H. repandum* L. — Hôpital, Beaumont, Mennessis.

H. velutinum (Fr.). — Hôpital, Mennessis.

H. zonatum (Batsch.). — Hôpital.

H. nigrum (Fr.). — Hôpital, Mennessis.

H. graveolens (Delast.). — Odeur de fenugrec à l'état sec. Hôpital.

H. tubiforme (Gillet). — Mennessis, Beaumont.

H. nodulosum (Fr.). — Résupiné, blanc. Marais d'Estouilly.

Téléphorés.

Craterellus Fr. — *C. cornucopioides* (L.). — Bois.

C. crispus (Sow.). — Bois. — *C. sinuosus* Fr. — Sancourt.

Telephora Ehrh. — *T. terrestris* Ehrh. — *T. laciniata* (P.). —

T. cristata (P.).

Auricularia Bull. — *A. mesenterica* (Dicks.). — Sur racine d'orme.

Cyphella Fr. — *C. ampla* (Lév.). — Sur branche tombée. Marais.

Stereum P. — *S. purpureum* P. — *S. hirsutum* (Willd.). —
S. ferrugineum (Bull.).

S. cristulatum (Quélet). — Se tache en rouge par le frottement.

Dans les bois sur chêne. Dans les marais toujours sur aulne.

S. album (Quélet). — Sur culée de peuplier. Marais d'Estouilly

Corticium Fr. — *C. incarnatum* Fr.

Clavariés.

Clavaria L. — *C. botrytes* (P.). — Villers-Bx.

C. amethystina (P.). — Hôpital, une seule fois.

C. curta (Fr.). — Cette clavaire a été trouvée en septembre 1891 sur un vieux saule des marais d'Estouilly. D'après M. Boudier, elle n'avait pas encore été signalée en France. — *C. cinerea* (Bull.). — Bois, marais. — *C. cristata* (P.). — Beaumont, marais. — *C. aurea* (Schæff.). — Villers-Bx. — *C. formosa* (P.). — Villers-Bx. — *C. stricta* (P.). — Marais. — *C. fragilis* (Holmsk.). — Herbes, marais. — *C. pistillaris* L. — Villers-Bx. — *C. juncea* (Fr.). *C. ophioglossoides*. — Hôpital.

Calocera Fr. — *C. cornea* (Batsch). — Sur orme, marais.

Typhula P. — *T. phacorrhiza* (Reich.). — Marais.

T. candida (F.). — Marais.

Trémellacés.

Tremella Dill. — *T. mesenterica* (Retz.). — Marais, très commune.

T. albida (Luds.). — Sur bois de peuplier pourri.

Hirneola Fr. — *H. auricula-Judæ* (L.).

GASTÉROMYCÈTES.

Cyathus Hall. — *C. striatus* (Hoffm.). — Frières, Sancourt, Villers-Bx.

Phallus L. — *P. impudicus* L. — Hôpital, Villers-Bx. Fourdrain, Beaumont.

Ph. canicus (Luds.). — Villers-Bx.

Lycoperdon Tourn. *L. giganteum* (Batsch). — Hardines.

L. pratense (P.). — *L. excipuliforme* (Scop.). — Marais. —

L. gemmatum (Fl. D.). — *L. piriforme* (Schæff.). — *L. pusillum* (Fr.).

Scleroderma P. *S. vulgare* (Fr.). — *S. verrucosum* (Bull.).

Hydnangium Quélet. — Cette espèce a été trouvée par M. Bourquelot, le 28 août 1892, dans le bois de Mennessis, au carrefour de la route Grévée et du chemin de la Sablière, au bord du fossé. Un individu se trouvait à fleur de terre, plusieurs autres ont été récoltés à quelques centimètres dans le sol. Le 22 septembre suivant, la même localité m'a fourni une douzaine d'échantillons à tous degrés de croissance, ayant de la grosseur d'un pois à la grosseur d'une forte noix. Jeune, cette espèce est d'un blanc pur, elle se colore en vieillissant jusqu'à la teinte acajou. Elle contient un suc qui devient rapidement jaune à l'air. Les basides ne portent qu'une spore. Pour M. Boudier, elle peut appartenir aux *H. galatheium* Quélet., *Stephensii* Berck., *carneum* Wall., qui ne formeraient qu'une seule et même espèce.

ASCOMYCÈTES.

Discomycètes charnus (Pézizés).

Morchella Dill. — *M. esculenta* (Bull.). — Var. *vulgaris*, *rotunda*.
Avril, mai. Sous les frênes, les ormes.

- Mitrophora** Lév. — *M. semilibera* (D.C.). — Avril, mai. Bois humides, marais.
- Verpa** Swartz. — *V. digitaliformis* (P.). — Avril, mai. Abondant en 1890, rare depuis. On le récolte mélangé au *M. semilibera*.
- Leptopodia** Boud. — *L. villosa* Boud. — *Helvella villosa* (Schæff.) — Rare. Sept. Estouilly.
- Helvella** L. — *H. crispa*. (Fr.). — Sept., oct., nov. Bois. — *H. pulla* (Holms.). — Août, sept. Estouilly, Sancourt. — *H. pallescens* (Schæff.). — Marais d'Estouilly. — *H. ephippium* (Lév.). — Bois. — *H. fuliginosa* (P.). — Août. Sancourt. — *H. sulcata* (Fr.). — Octobre. Sancourt. — *H. leucophæa* (P.). — Sept. Mennessis.
- Disciotis** Boud. — *D. venosa* (P.). — Commune sous les frênes dans les marais. Mai. Est recherchée comme comestible sous le nom d'oreille de cochon. Prend une odeur d'eau de javelle en vieillissant.
- Acetabula** Fuck. — *A. acetabulum* (L.). — Mai, juin.
- Macropodia** Fuck. — *M. macropus* (P.). — Sancourt, Hôpital, marais. Août, sept., oct.
- Aleuria** Fr. *A. vesiculosa* (Bull.). — Peut dépasser 10 cent. de diamètre dans les hardines, — *A. cerea* (Sow.). — Avril, oct. déc. Marais. — *A. ampliata* (Cook.). — Sur écorce de peuplier. Oct. — *A. busxæa* (Quél.). — Espèce rare trouvée dans le marais d'Estouilly. Sept. — *A. umbrina* (P.). — Bois. — *A. castanea* (Quél.). — Marais.
- Galactinia** Cook. — *G. badia* (P.). — *G. succosa* (Berk.). — Bois, marais. Juillet, sept., oct.
- Otidea** Fuck. — *O. onotica* (P.). — Hôpital. Octobre — *O. grandis* (P.). — Frières, Beaumont. Oct. — *O. leporina* (Fr.). — Sancourt. Oct.
- Pustularia** Fuck. — *P. catinus* Fuck. — Marais. Sept. — *P. cupularis* (L.). — Sancourt. Oct., déc. — *P. ochracea* (Boud.). — Mai, juin. Estouilly.

- Peziza** Dill. — *P. aurantia* (P.). Bois. Sept., oct. — *P. hæm-*
stigma Sturm.
- Lachnea** Fr. — *L. hemisphærica* (Weber). — Sancourt, marais.
Juillet, août, sept.
- Trichophœa** Boud. *Woolhopeia* (G. et Ph.). — Estouilly, Sept.
- Ciliaria** Quéf. — *C. scutellata* (L.). — Avril, mai, sept. Marais.
— *C. hirta* (Schum.). — Sept. Marais.
- Melastiza** Boud. — *M. miniata* (Fuck.). — Chemins des bois,
marais, silos d'herbes et de pulpes.
- Anthracobia** Boud. — *A. melaloma* (Alb. et Schw.). — Estouilly.
- Geoglossum** P. — *G. glabrum* P. — Marais. Oct. Rare.
- Microglossum** Sacc. — *M. viride* (P.). Marais. Oct. rare.
- Leotia** Hill. — *L. lubrica* (Scop.). — Villers-Bx . Marais. Sept.,
oct.
- Coryne** Tul. — *C. sarcoïdes* (Jacq.). — Marais. Très commun.
- Bulgaria** Fr. — *B. inquinans* (P.). — Bois.
- Sclerotinia** Fuck. — *S. tuberosa* (Hedw.). — Avril. Sancourt.
- Phialea** Fr. — *P. firma* (Bolt). — Sancourt.
- Helotium** Fr. — *H. serotinum* Fr. — Oct. Sancourt. — *H. fruc-*
tigenum (Bull.). — Bois.
- Lachnella** Fr. — *L. corticalis* (P.). — Marais.

